

Parodontologie

Uw gebit heeft houvast nodig. Het kaakbot, met daarop het tandvlees, vormt dit houvast. Ontstekingen aan het tandvlees kunnen het kaakbot aantasten. Tand en kiezen komen dan los te staan en kunnen op den duur zelfs uitvallen. Om dit te voorkomen, screenen tandartsen uw gebit jaarlijks op tandvleesproblemen.

PIPH, Parodontologie en Implantologie Praktijk Hank, is gespecialiseerd in parodontologie. U bent, na verwijzing van uw tandarts, van harte welkom voor een behandeling bij onze goed bereikbare praktijk in Hank. Voor de deur is volop gratis parkeergelegenheid.

Tandvleesproblemen? Raadpleeg eerst uw tandarts!

De belangrijkste oorzaak van ontstoken tandvlees is tandplak. Een ontsteking aan de rand van het tandvlees heet gingivitis. Als de ontsteking zich uitbreidt naar het kaakbot is er sprake van parodontitis. Parodontitis kan al lange tijd aanwezig zijn, zonder dat u het opmerkt. Daarom moet u alert zijn als u last heeft van bloedend of pijnlijk tandvlees bij het tandenpoetsen. U moet ook gewaarschuwd zijn als het tandvlees zich terugtrekt, de stand van de tanden verandert, tanden of kiezen los komen te staan of wanneer u hinder heeft van een vieze smaak of slechte adem.

Bespreek uw klachten altijd eerst met uw tandarts. Om uw tandvleesproblemen op te sporen en te behandelen kan uw tandarts u verwijzen naar PIPH. Het kan ook zijn dat uw tandarts u verwijst naar PIPH zónder dat u last heeft van bovengenoemde verschijnselen.

Eerste afspraak bij PIPH

Als uw tandarts u heeft doorverwezen naar PIPH, kunt u zelf een afspraak maken voor een eerste consult. De parodontoloog (officieel geregistreerd bij het NVvP) beoordeelt dan de toestand van uw tandvlees. Uw mond wordt grondig onderzocht. Zo wordt de tandvleesontsteking

gemeten met een zogenaamde pocketsonde. Een pocket is de ruimte tussen het tandvlees en de tanden en kiezen. Bij gezond tandvlees is de pocket maximaal drie millimeter diep. Tijdens het eerste consult worden ook röntgenfoto's gemaakt. Bovendien wordt uw tandheelkundige voorgeschiedenis besproken.

U krijgt informatie over de behandelmogelijkheden. Uw tandarts ontvangt een schriftelijke rapportage over dit bezoek. Daarin staat informatie over de vraagstelling, het onderzoek, de diagnose, de prognose en een behandelplanadvies. Een definitieve beslissing over een behandelplan wordt genomen in samenspraak met uw tandarts.

Behandelplan

PIPH werkt volgens een vast protocol, het zogenaamde paroprotocol. In de meeste gevallen start een parodontologische behandeling met een grondige schoonmaak van uw gebit. We noemen dit een initiële parodontale behandeling, ofwel een niet-chirurgische behandeling.

Na drie maanden komt u terug voor een herbeoordeling. De parodontoloog bekijkt dan het resultaat van de behandeling. Afhankelijk van het behandelresultaat wordt een vervolg behandelplan of nazorgplan opgesteld. Doel van nazorg is om te voorkomen dat er een nieuwe ontsteking ontstaat. U speelt daarbij zelf een belangrijke rol; namelijk door aandacht te besteden aan uw mondhygiëne. Vanzelfsprekend krijgt u tips over de methodes hoe u uw gebit het beste kunt reinigen.

Afspraak maken

Heeft u last van uw tandvlees? Bespreek uw klachten altijd eerst met uw tandarts. Parodontologische behandelingen zijn namelijk alleen mogelijk na een verwijzing van uw tandarts. U kunt, na verwijzing, zelf contact opnemen met PIPH om een afspraak te maken voor een intake.

U bent van harte welkom!